

ICPC-2B (beriket)

Ny utvidet versjon av ICPC-2 (International Classification of Primary Care)



ICPC-2 har 728 koder. Det er ikke tilstrekkelig som datagrunnlag for beslutningsstøtte eller for uttrekk for kvalitetsoppfølging i allmennpraksis

ICPC-2B =

ICPC-2 + mapping til ICD-10

ICPC2_Beriket	ICPC2_Term	ICPC2_Kode	ICD10_Kode	Synonymer
D99.0000	Sykdom i fordøyelsessystemet IKA	D99	K929	[Abdominale adheranser] [Allergisk/t
D99.0001	Adheranse abdominal	D99	K660	
D99.0002	Adheranse i bukhinne	D99	K660	
D99.0003	Analprolaps	D99	K622	
D99.0004	Betennelse bukspyttkjertel	D99	K850	
D99.0005	Blind loop syndrom	D99	K902	
D99.0006	Blindtarmssykdom IKA	D99	K389	
D99.0007	Blødning gastrointestinal INA	D99	K922	
D99.0008	Bukspyttkjertelsykdom IKA	D99	K869	
D99.0009	Cyste bukspyttkjertel	D99	K862	
D99.0010	Cøliaki	D99	K900	
D99.0011	Dumpingsyndrom	D99	K911	
D99.0012	Endetarmsfremfall	D99	K623	
D99.0013	Fettdiaré	D99	K900	
D99.0014	Fordøyelsesproblemer postoperativt	D99	K919	
D99.0015	Gastroenteritt			
D99.0016	Gastroenteritt			
D99.0017	Gastroenteritt			

Eksempel: Cøliaki ligger i samlekode D99 Sykdommer i fordøyelsessystemet IKA (ikke klassifisert annet sted).

ICPC-2-B gir cøliaki en unik kode slik at cøliaki kan registreres og gjenfinnes digitalt