



Direktoratet for  
e-helse



# Endringer i ICD-10 gjeldende fra 2017

Informasjon til sektoren

Avdeling helsefaglige kodeverk, oktober 2016



# Formålet med denne lysbildeserien

- Serien er laget for undervisningsformål og beregnet på ledere, klinikere og kodere i spesialisthelsetjenesten.
- Innhold:
  - Endringer i koder i ICD-10 gjeldende fra 1/1-2017 ([bilde 3- 6](#))
  - Advarsel mot å bruke opptrykte versjoner av kodeverket ([7](#))
  - Om andre versjoner av ICD-10 som ikke er til bruk i Norge ([8](#))
  - Om revisjonsarbeidet med ICD-10 ([9](#))
  - Hvordan sende inn endringsønsker ([10](#))
- Detaljer for alle endringer, samt Excelboken med alle gyldige koder fra 2017 er publisert på våre nettsider 29.09.2016, se [Kodeverket ICD-10 \(og ICD-11\)](#)



# Endringer i ICD-10 gjeldende fra 1/1- 2017 (1)

- 3 nye koder:
  - **K55.3 Angiodysplasi i tarm**
  - **K66.2 Retroperitoneal fibrose**
  - **Z50.30 Oppmøte for utlevering av legemiddel i Legemiddel assistert rehabilitering (LAR), uten samtidig konsultasjon**  
Brukes når pasienten kommer til spesialistavdelingen kun for overvåket legemiddelinntak i LAR
- 3 koder utgår:
  - **M31.2 Letalt midtlinjegrannulom** - erstattes av: **C86.0 Ekstranodalt NK/T-nasal type**
  - **Z29.0 Isolasjon** - Bruk i stedet diagnosekode + prosedyrekode
  - **Z29.9 Ikke spesifisert forebyggende tiltak** - Gir ingen meningsfull informasjon og tas derfor ut av bruk

For detaljer: Se [endringsdokumentet](#)



World Health Organization



# Endringer i ICD-10 gjeldende fra 1/1- 2017 (2)

- Norsk endring i undertekst:
  - **R65.1 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av infeksøs årsak med organsvikt**  
Undertekst: «*Alvorlig sepsis . Infeksjon og SOFA-skår  $\geq 2$  poeng*»

For detaljer: Se  
[endringsdokumentet](#)



World Health Organization



# Endringer i ICD-10 gjeldende fra 1/1- 2017 (3)

- Endringer i kodetekst eller undertekster til disse kapitlene eller kodene
  - **Kapittel I (A00-B99) Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer**
    - Kikhoste i perinatalperioden skal kodes med kode fra kapittel I, ikke kapittel P
  - **A06.5 Amøbeabscess i lunge**
  - **A08.1 Akutt gastroenteritt som skyldes norovirus**
  - **B22.7 Hiv-sykdom med flere sykdommer**
  - **F03 Annen og uspesifisert demens**
  - **F05.1 Delirium i forbindelse med demens**
  - **H02.5 Andre tilstander som påvirker øyelokkfunksjonen**
  - **H18.1 Bulløs keratopati**
  - **I10-I15 Hypertensjon**
  - **K22.2 Obstruksjon av spiserør**
  - **K55.2 Angiodysplasi i tykktarm**

For detaljer: Se [endringsdokumentet](#)



World Health Organization



# Endringer i ICD-10 gjeldende fra 1/1- 2017 (4)

- Endringer i kodetekst eller undertekster til disse kodene
  - **L50 Urticaria**
  - **M72.8 Andre spesifiserte sykdommer i fascier og annet fibrøst vev**
  - **M86.9 Uspesifisert osteomyelitt**
  - **N13.5 Knekkdannelse og striktur i urinleder, uten hydronefrose**
  - **Kapittel XVA (P00-P96) Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden**
  - **Q13.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i fremre del av øyet**
  - **Q39.4 Medfødt øsofageal membran**
  - **R63.6 Utilstrekkelig inntak av mat og væske**
  - **R65.1 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av infeksjøs årsak med organsvikt**
  - **T60.2 Andre og uspesifiserte insekticider**
  - **Z50.3 Rehabilitering av misbruker av legemidler og illegale substanser**

For detaljer: Se [endringsdokumentet](#)



World Health Organization

# Kodeverk er ferskvare!

- Det er nødvendig å følge med på kodeendringene for å bruke korrekt kode
- Retting av feilkoding er tidkrevende, kjedelig og koster penger
- Kun gyldig utgave av kodeverkene må være tilgjengelig i kliniske systemer
- Klinikerne bør ha tilgang til FinnKode.no fra PAS
- Kodebøker bør ikke benyttes;  
-var sist oppdaterte i 2011





# Andre ICD-10-versjoner som ikke brukes i Norge

- Det er mulig å laste ned fra nettet flere andre nasjonale modifikasjoner av ICD-10. Disse skal ikke brukes i Norge.
- Vi har fått en del henvendelser med referanser til ICD-10-CM:
  - ICD-10-CM = ICD-10 Clinical Modification
  - En tilpasset ICD-10 versjon til bruk i sykehus i USA, samme bruksområde som den internasjonale versjonen av ICD-10
  - Inneholder mer enn 68 000 koder
  - Kodeverket er mye mer detaljert enn den internasjonale versjonen fra WHO og derfor ikke fullt ut sammenlignbart med denne
  - ICD-10-CM-oppslagsverk eller henvisninger til ICD-10-CM må ikke benyttes for å finne koder for norsk bruk





# Om revisjonsarbeidet for ICD-10

- Som medlem av WHO er vi forpliktet til å bruke WHO's endringer
- Endringer i ICD-10 kommer i hovedsak fra WHO
  - WHO mottar innspill fra alle medlemsland
  - Endringer vurderes og evt. vedtas i WHO hver høst
  - Gjøres gjeldende i Norge vel ett år senere  
*Eks.: Endringer vedtatt høst 2015 blir gjeldende fra 1/1-2017.*
- Norge kan ikke alene opprette nye koder, men det er mulig å gjøre mindre nasjonale endringer ved å:
  - Velge å *ikke* bruke enkelte koder
  - Bruke 5.tegn
  - Presisere bruk i undertekster



# Ønske om endringer i ICD-10

- Alle ønsker sendes inn via [kodehjelp@ehelse.no](mailto:kodehjelp@ehelse.no)
- Frist for endringer som ønskes gjennomført fra kommende årsskifte:
  - 1. mai
- Disse opplysningene må følge med:
  - Et fagmiljø må stå bak. Kontaktperson må oppgis
  - Må beskrive om det er ønske om
    - ny kode
    - endring i kodetekst
    - endring i undertekst
    - endring i inklusjonskriterier
    - endring i eksklusjonskriterier
  - Begrunnelse for endringsønsket

